

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 22-7-65 399348

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

(COTE-D'OR, DOUBS, HAUTE-SAONE, JURA, SAONE-ET-LOIRE, TERRITOIRE DE BELFORT)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.

C. C. P. : DUON 3.405-19

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

Supplément n° 3 au Bulletin 58 - Juillet 1965

22 Juillet 1965

V I G N E

MILDIU - Les fortes précipitations de la deuxième décade de ce mois, ont provoqué des repiquages sur jeunes feuilles. En vue d'éviter l'extension de la maladie sur grappes, effectuer avec soin un traitement dans les derniers jours du mois.

L'application de ce traitement, à base de produits cupriques ou organo-cupriques, jointe aux rognages doit permettre une protection suffisante pour la fin de la campagne. Augmenter les doses en matière active.

OIDIUM - Ajouter un soufre micronisé mouillable à la bouillie anticryptogamique.

VERS DE LA GRAPPE - (Cochylis-Eudemis) - Consulter la note supplément n° 2 du Bulletin 58, (19 Juillet) Soulignons la nécessité du traitement dans les "climats à vers".

ARAIGNÉES ROUGES & ACARIOSE - Le cas échéant, ajouter un acaricide, à la bouillie fongicide et insecticide.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET POIRES.

Les pluies orageuses de ces derniers jours ayant lavé les pesticides et réduit la protection il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement.

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER.

Continuer les traitements dans les vergers contaminés en ajoutant un fongicide dans la bouillie ci-dessus.

OIDIUM - Poursuivre les applications.

POUMES DE TERRE

MILDIU : Les pluies récentes ont entraîné la progression de la maladie à partir des petits foyers installés depuis fin juin et se trouvant dans les situations les plus favorables au développement du mildiou.

Les récentes averses d'origine orageuse ont été plus ou moins importantes selon les secteurs mais elles furent en général suffisantes pour provoquer un certain lessivage des produits. Par ailleurs la végétation a été encore active dans certains secteurs où les plantations furent très tardives.

Il est souhaitable d'appliquer un nouveau traitement fongicide sur toutes les cultures dont on désire prolonger la végétation.

Dans les cultures atteintes fin juin, si malgré le traitement indiqué ci-dessus la maladie progresse rapidement dans les jours à venir, la seule solution restera la destruction chimique des fanes en ayant recours, soit au chlorate de soude à la dose de 20 kg/ha avec mouillant, soit à un défanant du commerce à la dose indiquée par le fabricant.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

H. SOULIE

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles

Imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté

Le Directeur-Gérant

L. BOUYX

P 103

